

La vaccination, la meilleure protection pour votre enfant

Juillet 2013



Calendrier de vaccination recommandé

| Vaccin qui protège contre : | À 2 mois | À 4 mois | À 6 mois | À 12 mois | À 18 mois | Entre 4 et 6 ans | 4 ^e année du primaire | 3 ^e année du secondaire |
|--|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------|--|--|
| Diphthérie-coqueluche-tétanos-hépatite B-polio-Hib | ✓ | ✓ | ✓ (sans l'hépatite B) | | ✓ | | | |
| Pneumocoque | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| Rotavirus | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Grippe, à l'automne | | | ✓ (6 à 23 mois) | | | | | |
| Méningocoque C | | | | ✓ | | | | ✓ (à compter du 1 ^{er} septembre 2013) |
| Rougeole-rubéole-oreillons-varicelle | | | | ✓ (sans la varicelle) | ✓ | | | |
| Diphthérie-coqueluche-tétanos-polio | | | | | | ✓ | | ✓ (sans la polio) |
| Hépatite B | | | | | | | ✓ (le vaccin utilisé protège aussi contre l'hépatite A) | |
| Virus du papillome humain | | | | | | | Filles seulement | |

Pour mieux protéger votre enfant, n'oubliez aucun vaccin et faites-le vacciner aux âges recommandés.

Pour toute question concernant la vaccination, adressez-vous à votre centre de santé et de services sociaux (CSSS), consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

